




! & / & 0 1 & 2 . / 3 &

/

5

5

4

(

(

5

4







> (((


(
(

(
(

55
*



5 * 5
BB



c 4 4

(

5

> ((3 / 8 5 & ((6 @

5

c

(

(

@@@

3

<

5

5

=

% ((

5

\$

B

(


5

-

5



-

'




ps62 ħ _2 Đ J

6 transetti - 26 reti 12 x 3,6 m a 6 sacche



#

\$



%

(

2

& 1


+ - K, - 8

8


3

&

6



: (



'



)

4'



M

B

5

((

\$

(

44

' B

(

N

c

/ < = c

. (

3 c


M

& B 5 (5



$$\begin{array}{r} \& \\ \hline + \\ 0 \quad P \end{array}$$





08

R



	%	! "#
1	10	10
2	20	20
3	30	30
4	40	40
5	50	50
6	60	60
7	70	70
8	80	80
9	90	90
10	100	100

	%	! "#
1	10	10
2	20	20
3	30	30
4	40	40
5	50	50
6	60	60
7	70	70
8	80	80
9	90	90
10	100	100

% &" ' ! "# \$

% &" ' ! "# \$

% &" ' ! "# \$

% &" ' ! "# \$



(

(

(

!

"

#

\$

% &

,

'

'

(

! () * + ", "

+

! - . . /+ ", ,0 1

/+ ", "



T

Bisogno di grandi dataset per evidenziare variazione nei parametri studiati (tra 500 e 3500 dati)

A meno 15 individui!anno, con ronta#i e con a tri studi\$
(%om-&ov et a \$, 2006' (a e) s*i et a \$, 2010)

+ (
+ igratrici su media distanza


"

specie	età		età x sesso			
	juv	ad	m-juv	f-juv	m-ad	f-ad
scricciolo		-	-	-	-	-
pe t rosso			-	-	-	-




[REDACTED]

[REDACTED]



/ isu tati dipendenti dag i indici sce ti

+ isure a ari, risu tati eterogenei



+ eg io usare pi8 indicatori 9

/isu tati dipendenti dag i indici sce ti



Eomanda4 6ua i sono g i indicatori mig ioriF

